

Số: 11/HD-TrT

An Lão, ngày 12 tháng 9 năm 2017

HƯỚNG DẪN
Phòng trừ sâu Cuốn lá nhỏ lúa 7 hại lúa vụ Mùa 2017

Trong những ngày qua, thời tiết nắng nhẹ, xen kẽ có mưa, trời mát là điều kiện rất thuận lợi cho sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 phát triển, gia tăng mật độ. Kết quả điều tra đồng ruộng ngày 12/9/2017 cho thấy, hầu hết các trà lúa giai đoạn làm đồng – trở bông đều có biểu hiện xanh tốt, thừa đạm; sâu non cuốn lá nhỏ lúa 7 đã nở với mật độ rất cao trên các trà lúa chưa trở. Mật độ sâu non tuổi 1, 2 phổ biến 100 – 150 con/m², nơi cao 300 – 500 con/m² (Trường Sơn, An Tiến, Tân Viên, Quốc Tuấn, Tân Dân...), cá biệt 850 con/m² (Trường Sơn – An Lão). Sâu non cuốn lá nhỏ lúa 7 sẽ cuốn lá lúa, ăn biểu bì mặt trên và diệp lục của lá dọc theo gân lá tạo thành những vết trắng dài, các vết này có thể nối liền với nhau thành từng mảng gây trắng toàn bộ diện tích lá lúa, đặc biệt trên lá giáp đồng và lá đồng. Nếu không tích cực phun trừ đúng kỹ thuật, nguy cơ mất năng suất và sản lượng lúa Mùa 2017 do sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 gây ra rất cao.

Trước tình hình trên, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 7, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2017 như sau:

- **Tiếp tục chủ động, tích cực tập trung phun trừ bằng thuốc hóa học đến ngày 14/9/2017 trên những diện tích lúa chưa trở. Những diện tích lúa trở sau ngày 15/9/2017 phải phun thuốc hai lần, lần hai phun sau lần thứ nhất 3 – 4 ngày.**

- Có thể sử dụng một số loại thuốc như Winter 635EC, Tasodant 600EC, Voliam targo 063SC, Wavotox 585EC, Director 70EC, Prevathon 5SC, Takumi 20SC, Sunset 300WG...

- Phải pha và phun đủ lượng nước thuốc trên diện tích lúa cần phun (theo hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì); phun ướt đều diện tích lá, hạn chế phối trộn thêm nhiều loại thuốc khác nhau trên cùng một đối tượng phòng trừ.

- Thuốc dạng hạt (bột), trước khi đổ vào bình phun, cần pha ra chai (ca) lắc đều cho tan hết thuốc sau đó mới đổ vào bình phun.

- Trong thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 7, thời tiết có thể có mưa xen kẽ. Vì vậy, cần tranh thủ trời tạnh ráo để phun trừ ngay; trong thời gian 4 tiếng sau khi phun thuốc nếu gặp trời mưa phải phun lại mới đạt hiệu quả phòng trừ.

- Khi phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ phải tuân thủ chặt chẽ theo nguyên tắc 4 đúng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Để tiết kiệm công phun, có thể kết hợp phun trừ bệnh khô vằn với phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bằng một số loại thuốc như Amistar Top 325SC, Nevo 330 EC, Eminent 125/150SE, Tilt super 300EC, Anvil 5SC ... (Liều lượng dùng như hướng dẫn trên bao bì).

* Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu đục thân hai chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn... để có biện pháp xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - HU, HĐND, UBND huyện An Lão; | Đề báo cáo |
| - QU, HĐND, UBND quận Kiến An; | |
| - Chi cục Trồng trọt và BVTV; | Đề phối hợp
chỉ đạo |
| - Phòng NN&PTNT huyện An Lão, | |
| - Phòng Kinh Tế quận Kiến An; | |
| - Đài phát thanh huyện, quận; | |
| - Trạm khuyến nông; | |
| - UBND các xã, phường, thị trấn; | |
| - Lưu. | |

TRƯỞNG TRẠM



Vũ Đức Dũng